

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

70
DLP-7-6-78452638
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL

60 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Regisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 116 (15/78) 5 JUIN 1978

VIGNE

MILDIOU

Depuis le 29 Mai de rares taches de mildiou ont été découvertes. Le réchauffement constaté depuis la fin du mois et durant les premiers jours de Juin permet un développement rapide de la végétation. De plus en raison des pluies orageuses, le risque d'extension de la maladie est sérieux. En conséquence nous conseillons de réaliser un traitement dans les plus brefs délais.

EUTYPIOSE ou "maladie du bras mort". Actuellement on note une recrudescence marquée de cette affection qui se traduit par un dépérissement de la végétation, souvent sur un seul bras du cep; avec croissance chétive et rabougrie. Les feuilles des rameaux atteints d'un vert jaunâtre présentent des nécroses marginales ou internervaires. Les plus touchées ne tardent pas à sécher et à tomber, seule la tige dénudée restant verte. Les vignes âgées avec de nombreuses plaies de taille, sont les plus touchées. On ne connaît pas de moyen de lutte. Cette maladie fait actuellement l'objet d'études approfondies.

VERS de la GRAPPE Le vol est irrégulier en eudénis. La cochylis est présente dans le Haut-Poitou. Attendre un prochain bulletin.

POMMIER - POIRIER

TAVELURE

Il convient de prendre garde au lessivage provoqué par les pluies d'orage. Le risque est réel, même dans les vergers où aucune tache n'est apparue jusqu'à présent.

CARPOCAPSE

Le vol se poursuit, attendre un prochain bulletin.

CEREALES

TOUTES MALADIES

Peu d'informations nouvelles nous étant parvenues depuis notre précédent bulletin, nous considérons la situation comme pratiquement inchangée. On peut cependant craindre que les pluies d'orages aient permis la montée de la septoriose sur l'épi notamment dans les parcelles où cette maladie était présente sur les deux dernières feuilles.

PUCERONS

Les populations sont très faibles et aucun traitement ne se justifie.

..../...

P 332

DESHERBAGE en POSLEVÉE du MAIS

TRAITEMENT sur MAIS ayant 40 à 60 cm, III DIRIGE

Ce sont des traitements dirigés sur l'interligne en évitant de mouiller les feuilles du maïs. Ils sont réalisés sur une culture ayant entre 40 et 60 cm et ils sont à éviter dès l'apparition des racines coronaires (surtout avec les hormones). Ils nécessitent un équipement spécial : pendillards (jets suspendus) ou rampe à patins maintenant une hauteur constante par rapport au sol (type Herbi Net). Cet équipement comporte des buses miroirs (à la rigueur des buses à fente) qui permettent de pulvériser à grosses gouttes et à basse pression (un bar), ce qui limite la formation de brouillard susceptible d'être entraîné sur les feuilles du cornet. Pour certains produits (paraquat, aminotriazole), il est préférable de compléter cet équipement par des plaques empêchant la projection des gouttes sur la culture.

Matière active M.A.	Dose MA/Ha	Produit commercial P.C.	Dose PC/Ha	A d v e n t i c e s
Produits hormonaux, pas de rémanence d'action, efficaces sur dicotylédones				
2 4 D	1000	Nonb.spécialités	selon %	dic. annuelles, liseron, chardon
2 4 5 T	1000	iden	iden	dic. annuelles, liseron, chardon, ronce, gesse tubéreuse.
2 4 5 T P	1000	iden	iden	dic. annuelles, liseron, chardon, ronce, gesse tubéreuse, préle, potentille.
2 4 D+2 4 5 T	660 + 330	iden	iden	dic. annuelles, liseron, chardon, ronce, gesse tubéreuse.
Produits à action foliaire et racinaire, rémanents dans le sol, efficaces sur graminées et dicotylédones				
Anétryne	2500	Anéphyt 80 %	3 Kg	gran. et dic. annuelles jeunes (< 15cm)
Linuron	2500	Nonb.spécialités	5 Kg	gran. et dic. annuelles jeunes (< 8cm)
Terbutryne	2500	Igrane	5 Kg	gran. et dic. annuelles jeunes (< 15cm)
Produits à action foliaire, non rémanents, efficaces sur graminées et dicotylédones				
Paraquat	600	Granoxone	3 l	gran. et dic. très jeunes (< 8 cm)
Aminotriazole	3600	Nonb.spécialités	15 l	traitement complété par 3 l de granoxone 10 jours après, chiendent, cynodon dactylon.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"POITOU-CHARENTES"

R. GUILLEMINET

Inprimé à la Station le 5 Juin 1978 - Précédente Note : Bulletin n° 115-31 Mai 78.

N° de papier de presse : 535 AD.